

ΤΜΗΜΑ Γ – Στοιχεία της αίτησης*:

1. Αιτούμενο/α* Φυτοπροστατευτικό/α Προϊόν/όντα	α/α	Εμπορικό όνομα	Δραστική/ες ουσία/ες	ΑΑΔΑ (αν υφίσταται)	PPPAMS (αποδεικτικό)
	1	Movento 150 OD	Spirotetramat 15,78 %	---	PPP-2026- 37851

2. Πεδίο εφαρμογής:	Αμπέλι – VITVI, Ακτινίδιο - ATICH
---------------------	-----------------------------------

3. Στόχος:	Αμπέλι: <i>Planococcus</i> sp. - PLANSP, <i>Planococcus ficus</i> PLANFI – <i>Pseudococcus</i> sp. PSECSP, <i>Aleurocanthus spiniferus</i> – ALECSN Ακτινίδιο: <i>Aonidiella aurantii</i> – AONDAU <i>Aspidiotus nerii</i> – ASPDNE <i>Aspidiotus</i> sp.- ASPDSP <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> – CHRYDI, <i>Diaspis</i> sp. – DIASSP <i>Epidiaspis leperii</i> – EPIDBE <i>Eulecanium persicae</i> LECAPE <i>Lepidosaphes</i> sp. – LEPSSP <i>Melanaspis inopinata</i> – MELAIN <i>Parlatoria oleae</i> – PARLOR <i>Planococcus /Pseudococcus citri</i> -PSECCI <i>Parthenolecanium pruinosum</i> -LECAPI <i>Parthenolecanium corni</i> – LECAC <i>Pseudalacaspis pentagona</i> -PSEAPE <i>Quadraspidotus perniciosus</i> - QUADPE <i>Quadraspidotus juglansregiae</i>-QUADJU, <i>Saissetia oleae</i> – SAISOL <i>Sphaerolecanium prunastri</i> -LECAPN <i>Ceroplastes rusci</i> – CERPRU <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> – CHRYDI <i>Hemiberlesia lataniae</i> – HEBELA <i>Hemiberlesia rapax</i> – HEBERA <i>Coccus hesperidum</i> – COCCHE <i>Metcalfa pruinosa</i> - METFPR
------------	--

4. Χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται η παρέκκλιση:	Έναρξη	Λήξη
	7 Μαΐου 2026	3 Σεπτεμβρίου 2026
Αιτιολόγηση σε περίπτωση απρόβλεπτου κινδύνου*:	---	

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

5. Βασική αιτιολόγηση του κινδύνου:

	Περιπτώσεις	Αιτιολόγηση
1)	Απουσία εγκεκριμένων φ.π. και μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης για την αιτούμενη χρήση (ακτινίδιο)	Σύμφωνα με τη βάση του ΥΠΑΑΤ προκύπτει ουσιώδες κενό φυτοπροστασίας για το Ακτινίδιο έναντι των κοκκοειδών (Coccoidea), καθώς για την πλειονότητα των καταγεγραμμένων εχθρών δεν υφίστανται εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (ενδεικτικά: <i>Aspidiotus</i> sp./ <i>A. nerii</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> , <i>Diaspis</i> sp., <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Eulecanium persicae</i> , <i>Lepidosaphes</i> sp., <i>Melanaspis inopinata</i> , <i>Parlatoria oleae</i> , <i>Parthenolecanium corni</i> , <i>Saissetia oleae</i> , <i>Hemiberlesia</i> sp. κ.ά.
2)	Ανάγκη χρονικού διαστήματος προσαρμογής σε αγρονομικές ή κοινωνικές συνθήκες από την κατάργηση μιας ευρέως διαδεδομένης χρήσης στο παρελθόν. (Ακτινίδιο και Αμπέλι)	Το Movento 150 OD (spirotetramat, IRAC 23) έχει αποτελέσει διαχρονικά κρίσιμο εργαλείο φυτοπροστασίας στην αμπελοκαλλιέργεια (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο σταφύλι) και στην καλλιέργεια ακτινιδίου, καθώς συνδυάζει διακριτό τρόπο δράσης έναντι των υφιστάμενων επιλογών με αμφικινητική διασυστηματική μετακίνηση μέσω ξυλώματος και ηθμού (φλοιώμα) (ακροπέταλη και βασιπέταλη), εξασφαλίζοντας κατανομή στη νέα βλάστηση και σε προφυλαγμένους ιστούς όπου εγκαθίστανται οι εν λόγω μυζητικοί εχθροί. Επιπλέον, η δράση του ως αναστολέα της acetyl-CoA carboxylase (ACC) παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση λιπιδίων και οδηγεί σε ουσιαστική αναστολή της ανάπτυξης και της αναπαραγωγικής ικανότητας των εντόμων-στόχων, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της δυναμικής των πληθυσμών και στον περιορισμό της εξέλιξης της προσβολής, ιδίως όταν η επέμβαση πραγματοποιείται στοχευμένα στα κατάλληλα στάδια. Στις αιτούμενες ΠΕ για το αμπέλι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν συστηματικά πίεση από μυζητικούς εχθρούς, και ειδικότερα από ψευδόκοκκους (<i>Planococcus citri</i>, <i>Planococcus ficus</i>, <i>Planococcus</i> sp./ <i>Pseudococcus</i> sp.) και τον αλευρώδη <i>Aleurocanthus spiniferus</i>, οι οποίοι προκαλούν σημαντικές ποιοτικές εκπτώσεις μέσω παραγωγής μελιτωμάτων και επακόλουθης ανάπτυξης καπνιάς και ρύπανσης των τσαμπιών, αυξάνοντας τις απορρίψεις και το κόστος διαλογής/τυποποίησης, με άμεσο αντίκτυπο στην εμπορευσιμότητα. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται και στο ακτινίδιο κυρίως από κοκκοειδή καθώς προσβάλλουν ξυλώδη όργανα και/ή καρπούς και οδηγούν σε ποιοτική υποβάθμιση, με αποτέλεσμα αυξημένες απορρίψεις και υποβάθμιση κατηγορίας κατά την τυποποίηση, γεγονός που υπονομεύει την εμπορευσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Ο <i>Aleurocanthus spiniferus</i> αποτελεί ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας, για τον οποίο προβλέπονται ειδικά μέτρα φυτοϋγείας και περιορισμού σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό (2022/1927), γεγονός που αυξάνει σημαντικά το διακύβευμα ως προς την έγκαιρη αντιμετώπιση των πληθυσμών και την αποτροπή διασποράς σε παραγωγικές ζώνες. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ με τον <i>Aleurocanthus</i>

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

		<i>spiniferus</i> στο αμπέλι, με προκύπτει ότι οι διαθέσιμες εγκεκριμένες λύσεις στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένες, καθώς καταγράφεται ουσιαστικά μία μόνο επιλογή, ήτοι τα λυπαρά οξέα C7–C18 (IRAC UNE: μη ειδικού/μη καθορισμένου μηχανισμού δράσης). Η συγκεκριμένη κατηγορία δρα κυρίως με επαφή και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από πολύ υψηλή κάλυψη/διαβροχή ("λούσιμο") του φυλλώματος, κάτι που πρακτικά δυσχεραίνεται λόγω της εγκατάστασης του εχθρού σε προφυλαγμένες θέσεις (κυρίως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων) και της συχνά ανομοιόμορφης κάλυψης σε συνθήκες πυκνής βλάστησης. Ως αποτέλεσμα, η δυνατότητα σταθερού και αξιόπιστου ελέγχου είναι οριακή, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή διασποράς σε άλλες παραγωγικές ζώνες. Υπό τα ανωτέρω, το Movento 150 OD (spirotetramat, IRAC 23) τεκμηριώνεται ως κρίσιμο εργαλείο, ενισχύοντας τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου και περιορισμού του εχθρού σε ζώνες υψηλής παραγωγικής βαρύτητας. Η αξία του Movento 150 OD στο αμπέλι και στο ακτινίδιο συνδέεται άμεσα με το προφίλ των αιτούμενων εχθρών. Η ανάκληση του Movento 150 OD έχει δημιουργήσει ουσιαστικές κενό φυτοπροστασίας στο αμπέλι και στο ακτινίδιο και καθιστά επιτακτική την ανάγκη προσαρμογής των παραγωγών και των γεωπόνων στις νέες αγρονομικές συνθήκες. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα αιτήματα κατ' παρέκκλιση για σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία spirotetramat έχουν κατατεθεί και σε άλλες χώρες της Νότιας Ζώνης (Ιταλία). Ακόμη, η Σλοβενία έχει ήδη χορηγήσει κατά παρέκκλιση χρήση στο αμπέλι μεταξύ άλλων καλλιεργειών. Ως εκ τούτου, η χορήγηση κατ' παρέκκλιση άδειας διάρκειας έως 120 ημερών για το Movento 150 OD τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για τη διασφάλιση πρωτίστως της προστασίας των καλλιεργειών, της παραγωγικότητας και, κυρίως, της εμπορικής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, στις αιτούμενες ζώνες, καθώς και για την υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης του <i>Aleurocanthus spiniferus</i> στο αμπέλι, δεδομένης της φυτοϋγειονομικής βαρύτητάς του ως ενωσιακού εχθρού καραντίνας.
3.1)	Η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας βάσει του τρόπου δράσης των ήδη εγκεκριμένων φπ	Σύμφωνα με την βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ για το αμπέλι: Προκύπτει ότι η αντιμετώπιση των αιτούμενων εχθρών (ψευδόκοκκοι: <i>Planococcus citri</i>, <i>Planococcus ficus</i>, <i>Planococcus</i> sp./<i>Pseudococcus</i> spp.), στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό δραστικών ουσιών και, κατ' επέκταση, σε στενή δεξαμενή μηχανισμών δράσης (MoA/IRAC). Η εικόνα αυτή μειώνει ουσιαστικά τη δυνατότητα εναλλαγής μηχανισμών δράσης εντός, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιλεκτική πίεση στις εναπομείνουσες ομάδες και να εντείνεται η πιθανότητα ανάπτυξης/εγκατάστασης ανθεκτικών πληθυσμών. Αντίστοιχα, για το ακτινίδιο πέρα από την απουσία εγκεκριμένων φ.π. σχεδόν για τον

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

	σύνολο των αιτουμένων εχθρών παρατηρείται ότι ακόμη και στις λίγες περιπτώσεις όπου καταγράφεται διαθέσιμη επιλογή (π.χ. <i>Aonidiella aurantii</i> με λιπαρά οξέα C7-C18, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> με λιπαρά οξέα C7-C18 / maltodextrin / paraffin oils, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ή/και <i>Ceroplastes rusci</i> με παραφινέλαιο), αυτές ανήκουν κατά κανόνα σε σκευάσματα μη ειδικού/μη καθορισμένου μηχανισμού δράσης (IRAC UNE) και δρουν κυρίως με επαφή, με αποτελεσματικότητα που εξαρτάται από πολύ υψηλή κάλυψη/διαβροχή των προσβεβλημένων επιφανειών. Ενώ, αν και για το <i>Metcalfa pruinosa</i> καταγράφονται περισσότερες επιλογές (π.χ. emamectin/IRAC 6, etofenprox/IRAC 3A και προϊόντα επαφής/IRAC UN), αυτές όμως δεν καλύπτουν το κενό έναντι του εχθρού αυτού. Συνεπώς, η συνολική εικόνα των διαθέσιμων λύσεων στο αμπέλι και στο ακτινίδιο αποτυπώνει απουσία (για τους περισσότερους εχθρούς στο ακτινίδιο) ή οριακή κάλυψη αποτελεσματικών επιλογών, με άμεσες και πολύπλευρες επιπτώσεις στην καλλιέργειες και στις αιτούμενες ζώνες. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κατατίθεται αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, αναφορικά με τις επείγουσες καταστάσεις, ώστε να επιτραπεί η χρήση του προϊόντος Movento 150 OD στο αμπέλι και στο ακτινίδιο. Το προτεινόμενο GAP είναι ταυτόσημο με τις εγκεκριμένες χρήσεις του προϊόντος που ίσχυαν στην Ελλάδα πριν από την ανάκληση, χωρίς καμία μεταβολή ως προς τις βασικές παραμέτρους εφαρμογής. Επιπλέον, τα MRLs για τις ανωτέρω καλλιέργειες παραμένουν όπως ίσχυαν. Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται πρόσθετοι κίνδυνοι για τον χρήστη και το περιβάλλον, σε σχέση με τις εγκεκριμένες χρήσεις που ίσχυαν πριν από την ανάκληση.
--	---

6. Περιορισμός της αιτούμενης χρήσης:

1. Στις Περιφερειακές Ενότητες:	α/α	Π.Ε.
	1	Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ (Για το αμπέλι και το ακτινίδιο)
	2	Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ (Για το αμπέλι και το ακτινίδιο)
	3	Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ (Για το αμπέλι και το ακτινίδιο)
	4	Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	5	Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	6	Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	7	Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μόνο για το αμπέλι)
	8	Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	9	Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	10	Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	11	Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	12	Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	13	Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Μόνο για το αμπέλι)
	14	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ (Μόνο για το ακτινίδιο)
	15	Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Μόνο για το ακτινίδιο)
	16	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ (Μόνο για το ακτινίδιο)